

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®
POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°16 du 05 Juillet 2000 - 2 pages

Cultures Légumières

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR

Dans les parcelles de drageons, les populations de pucerons noirs sont en augmentation. Dans les parcelles en cours de récolte, les populations de pucerons se maintiennent à des niveaux peu élevés.
La faune auxiliaire est très présente : coccinelles,punaises et chrysopes.
Il est encore trop tôt pour intervenir contre les pucerons.

FINISTERE

Dans les parcelles de drageons, les pucerons verts sont peu nombreux et les pucerons noirs sont en progression dans bon nombre de parcelles. Il s'agit de petites colonies disséminées sur un grand nombre de plants. Dans les parcelles en cours de récolte, les populations de pucerons se maintiennent à des niveaux faibles.
La faune auxiliaire est bien présente, les pontes de chrysopes sont très nombreuses.
Il est encore trop tôt pour intervenir contre les pucerons.

ILLE ET VILAINE


Les populations de pucerons noirs sont en augmentation dans les parcelles de drageons. Dans les autres parcelles, les populations de pucerons se maintiennent à des niveaux faibles.
La présence des prédateurs est remarquée : coccinelles et chrysopes.
Il est encore trop tôt pour intervenir contre les pucerons.

CHOU

MOUCHE DU CHOU

ILLE ET VILAINE


Dans bon nombre de parcelles, les pontes de mouche relevées sont en augmentation.
Maintenez la protection.



Prochain numéro le 12 Juillet 2000

Situation sanitaire mildiou des parcelles de pommes de terre suivies dans les Côtes d'Armor, le Finistère et en Ille et Vilaine

Région \ Classe		1 Pas de symptômes	2 Qq symptômes, pas de foyer	3 Foyer (s) constitué (s)
Côtes d'Armor (22)		Pas de parcelle	Nombreuses parcelles	Quelques parcelles
29	St Pol de Léon	Pas de parcelle	Nombreuses parcelles	Quelques parcelles
29	Le Conquet-Ploudalmézeau	Pas de parcelle	Nombreuses parcelles	Quelques parcelles
Ille et Vilaine (35)		Pas de parcelle	Nombreuses parcelles	Quelques parcelles



Artichaut :
Augmentation des pucerons noirs
Pomme de terre :
Mildiou, risques élevés.

DRAF Bretagne
Service Régional de la Protection des Végétaux
B.P. 60116
35701 RENNES CEDEX

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rennes
Directeur gérant : P.BLANCHET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382
Tarif Courrier 555 Frs - Fax 655 Frs

P24

POMME DE TERRE

MILDIOU

COTES D'ARMOR FINISTERE ILLE ET VILAINE

Les attaques de mildiou continuent leur progression lentement.
Les traitements appliqués précédemment ont été lessivés en Côtes d'Armor.
D'importantes nouvelles contaminations ont eu lieu et d'autres tout aussi importantes sont annoncées par nos modèles de prévisions épidémiologiques. Les risques de développement du mildiou restent très élevés et en particulier le risque de contamination des tubercules dans les parcelles fortement contaminées.

Maintenez la protection.

Respectez les délais d'emploi avant récolte :

REMILTINE, ACROBAT M, SAGITERRE et OHAYO : 7 jours

ACYLON P : 15 jours

TATTOO C, BRESTAN et TOPMIL FLO : 21 jours

PULSAN, TRECATOL et SIRDATE P : 30 jours.

Au moment du défanage, ajoutez un fongicide à la bouillie en vérifiant bien la compatibilité des spécialités pour protéger les tubercules contre le mildiou.

DORYPHORES

ILLE ET VILAINE

De nombreux doryphores ont été observés à Saint Malo et à Saint Coulomb.

Dans les parcelles concernées par les doryphores, ajoutez un insecticide à la bouillie en vérifiant bien la compatibilité avec le fongicide utilisé. De nombreux produits sont homologués.

CULTURES BIOLOGIQUES

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR

Les populations de pucerons verts restent très faibles.
Les populations de pucerons noirs augmentent nettement en particulier dans les parcelles de drageons où certains pieds sont très sérieusement infestés.
Dans les parcelles plus âgées, les populations de pucerons noirs restent faibles à l'exception de quelques capitules fortement colonisés.
Cette semaine encore, nous avons observé beaucoup de punaises prédatrices, quelques coccinelles ainsi que de nombreuses pontes de chrysopes.

Dans les parcelles en cours de récolte, il est inutile de traiter, les auxiliaires maîtrisant bien les quelques pucerons présents. Durant la récolte, éliminez manuellement les têtes plus sérieusement atteintes.

Pour les parcelles plantées cette année, la date d'apparition des capitules étant encore éloignée, il n'est pas non plus nécessaire d'intervenir.

FINISTERE

Les populations de pucerons verts sont toujours faibles.
On note une progression des populations de pucerons noirs dans de nombreuses parcelles. Cependant, ces pucerons sont le plus souvent représentés par de petites colonies disséminées.
Une bonne activité des auxiliaires est observée et en particulier des chrysopes.

Il est inutile d'intervenir contre les pucerons.

Dans le cas d'une présence importante de pucerons noirs sur certains pieds isolés, pensez à éliminer ces plants de la parcelle.

ILLE ET VILAINE

Les populations de pucerons verts sont toujours très faibles.
On continue à constater l'apparition de quelques pucerons noirs mais en quantité peu importante.

Il est inutile d'intervenir contre les pucerons.

POMME DE TERRE

MILDIOU

COTES D'ARMOR FINISTERE

Le mildiou est toujours présent sur l'ensemble des parcelles observées mais a peu progressé depuis la semaine dernière.
Les risques de développement du mildiou restent toujours assez élevés et des contaminations sont prévues pour les jours à venir par nos modèles épidémiologiques.

Maintenez la protection en respectant les conditions d'utilisation des produits à base de cuivre (pensez à adapter les doses de spécialités par hectare en fonction du pourcentage en cuivre des produits employés).

Dans les parcelles fortement attaquées par le mildiou, défanez afin de protéger les tubercules contre le mildiou.